№ п/п	Показатель	Норма	Результат
	Компонент II	Должен быть нетоксичным	Нетоксичный
11	**Общий белок** *Компонент I* *Компонент II*	 Не более 50 мкг/доза Не более 50 мкг/доза	 8,2 мкг/доза 4,7 мкг/доза
12	**Бактериальные эндотоксины** *Компонент I* *Компонент II*	 Не более 100 ЕЭ/доза Не более 100 ЕЭ/доза	 Менее 100 ЕЭ/доза Менее 100 ЕЭ/доза
13	**Специфическая активность** *Компонент I*	Препарат должен содержать (1,0±0,5) х 10^{11} рекомбинантных аденовирусных частиц 26 серотипа, содержащих ген белка S вируса SARS-CoV-2, в дозе (0,5 мл) Средний титр специфических антител к гликопротеину S вируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови вакцинированных мышей должен составлять не менее чем 1:250	0,82 х 10^{11} частиц/доза 1 : 2600
	Компонент II	Препарат должен содержать (1,0±0,5) х 10^{11} рекомбинантных аденовирусных частиц 5 серотипа, содержащих ген белка S вируса SARS-CoV-2, в дозе (0,5 мл) Средний титр специфических антител к гликопротеину S вируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови вакцинированных мышей должен составлять не менее чем 1:1000	0,66 х 10^{11} частиц/доза 1: 28 800
14	**Остаточный белок культуры клеток** Компонент I Компонент II	 Не более 84 нг/доза Не более 111 нг/доза	 0,1 нг/доза 0,1 нг/доза
15	**Упаковка**	По 0,5 мл (1 доза) компонента препарата в ампулах по ТУ 9462-001-53908805-2006 или ТУ 9462-001-84299122-2010 из бесцветного стекла 1-го гидролитического класса. На каждую ампулу наклеена этикетка самоклеящаяся. По 5 ампул каждого компонента препарата в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. По 1 контурной ячейковой упаковке вместе с инструкцией по применению - в пачку из картона	