№ п/п	Показатель	Норма	Результат
	Компонент II	Должен быть стерильным	Стерильный
9	**Специфическая безопасность** *Компонент II*	Не более 50 репликативно-компетентных аденовирусов на дозу	Менее 50 репликативно-компетентных аденовирусов на дозу
10	**Аномальная токсичность** *Компонент I* *Компонент II*	Должен быть нетоксичным Должен быть нетоксичным	Нетоксичный Нетоксичный
11	**Общий белок** *Компонент I* *Компонент II*	Не более 50 мкг/доза Не более 50 мкг/доза	23,1 мкг/доза 20,6 мкг / доза
12	**Бактериальные эндотоксины** *Компонент I* *Компонент II*	Не более 100 ЕЭ/доза Не более 100 ЕЭ/доза	Менее 100 ЕЭ/доза Менее 100 ЕЭ/доза
13	**Специфическая активность** *Компонент I*	Препарат должен содержать (1,0±0,5) х 10^{11} рекомбинантных аденовирусных частиц 26 серотипа, содержащих ген белка S вируса SARS-CoV-2, в дозе (0,5 мл)	0,94 х 10^{11} частиц/доза
		Средний титр специфических антител к гликопротеину S вируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови вакцинированных мышей должен составлять не менее чем 1:250	1 : 5600
	Компонент II	Препарат должен содержать (1,0±0,5) х 10^{11} рекомбинантных аденовирусных частиц 5 серотипа, содержащих ген белка S вируса SARS-CoV-2, в дозе (0,5 мл)	0,78 х 10^{11} частиц/доза
		Средний титр специфических антител к гликопротеину S вируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови вакцинированных мышей должен составлять не менее чем 1:1000	1 : 76 800