№ п/п	Показатель	Норма	Результат
8	**Стерильность** *Компонент I* *Компонент II*	Должен быть стерильным Должен быть стерильным	Стерильный Стерильный
9	**Специфическая безопасность** *Компонент II*	Не более 50 репликативно-компетентных аденовирусов на дозу	Менее 50 репликативно-компетентных аденовирусов на дозу
10	**Аномальная токсичность** *Компонент I* *Компонент II*	Должен быть нетоксичным Должен быть нетоксичным	Нетоксичный Нетоксичный
11	**Общий белок** *Компонент I* *Компонент II*	Не более 50 мкг/доза Не более 50 мкг/доза	12,6 мкг/доза 13,9 мкг / доза
12	**Бактериальные эндотоксины** *Компонент I* *Компонент II*	Не более 100 ЕЭ/доза Не более 100 ЕЭ/доза	Менее 100 ЕЭ/доза Менее 100 ЕЭ/доза
13	**Специфическая активность** *Компонент I*	Препарат должен содержать (1,0±0,5) x 10^{11} рекомбинантных аденовирусных частиц 26 серотипа, содержащих ген белка S вируса SARS-CoV-2, в дозе (0,5 мл) Средний титр специфических антител к гликопротеину S вируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови вакцинированных мышей должен составлять не менее чем 1:250	0,91 x 10^{11} частиц/доза 1 : 8 800
	Компонент II	Препарат должен содержать (1,0±0,5) x 10^{11} рекомбинантных аденовирусных частиц 5 серотипа, содержащих ген белка S вируса SARS-CoV-2, в дозе (0,5 мл) Средний титр специфических антител к гликопротеину S вируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови вакцинированных мышей должен составлять не менее чем 1:1000	0,78 x 10^{11} частиц/доза 1 : 76 800