№ п/п	Показатели	Нормы	Результаты
	Компонент II	Должен быть стерильным	Стерильный
9	**Специфическая безопасность** *Компонент II*	Не более $1x10^3$ репликативно-компетентных аденовирусов на дозу	Менее $1x10^2$ репликативно-компетентных аденовирусов на дозу
10	**Аномальная токсичность** *Компонент I* *Компонент II*	Должен быть нетоксичным Должен быть нетоксичным	Нетоксичный Нетоксичный
11	**Общий белок** *Компонент I* *Компонент II*	Не более 50 мкг/доза Не более 50 мкг/доза	15,8 мкг/доза 5,3 мкг/доза
12	**Бактериальные эндотоксины** *Компонент I* *Компонент II*	Не более 100 ЕЭ/доза Не более 100 ЕЭ/доза	Менее 100 ЕЭ/доза Менее 100 ЕЭ/доза
13	**Специфическая активность** *Компонент I* *Компонент II*	Препарат должен содержать $(1,0\pm0,5) \times 10^{11}$ рекомбинантных аденовирусных частиц 26 серотипа, содержащих ген белка S вируса SARS-CoV-2, в дозе (0,5 мл) Средний титр специфических антител к гликопротеину Sвируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови вакцинированных мышей должен составлять не менее чем 1:250 Препарат должен содержать $(1,0\pm0,5) \times 10^{11}$ рекомбинантных аденовирусных частиц 5 серотипа, содержащих ген белка S вируса SARS-CoV-2, в дозе (0,5 мл) Средний титр специфических антител к гликопротеину Sвируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови вакцинированных мышей должен составлять не менее чем 1:1000	$0,67 \times 10^{11}$ частиц/доза 1: 7 200 $0,50 \times 10^{11}$ частиц/доза 1 : 64 000