| № п/п | Показатель | Норма | Результат |
|---|---|---|---|
| 8 | **Стерильность**<br>*Компонент I*<br>*Компонент II* | Должен быть стерильным<br>Должен быть стерильным | Стерильный<br>Стерильный |
| 9 | **Специфическая безопасность**<br>*Компонент II* | Менее 5 репликативно-компетентных аденовирусных частиц / доза | Менее 5 репликативно-компетентных аденовирусных частиц / доза |
| 10 | **Общий белок**<br>*Компонент I*<br>*Компонент II* | Не более 10 мкг/доза<br>Не более 10 мкг/доза | 7,0 мкг/доза<br>6,7 мкг / доза |
| 11 | **Бактериальные эндотоксины**<br>*Компонент I*<br>*Компонент II* | Не более 100 ЕЭ/доза<br>Не более 100 ЕЭ/доза | Менее 50 ЕЭ/доза<br>Менее 100 ЕЭ/доза |
| 12 | **Специфическая активность**<br>*Компонент I*<br><br><br><br><br><br>*Компонент II* | Препарат должен содержать (2,0±1,5) x $10^{10}$ рекомбинантных аденовирусных частиц 26 серотипа, содержащих ген белка S вируса SARS-CoV-2, в дозе (0,5 мл)<br>Средний титр специфических антител к гликопротеину S вируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови вакцинированных мышей должен составлять не менее чем 1:250<br>Препарат должен содержать (2,0±1,5) x $10^{10}$ рекомбинантных аденовирусных частиц 26 серотипа, содержащих ген белка S вируса SARS-CoV-2, в дозе (0,5 мл)<br>Средний титр специфических антител к гликопротеину S вируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови вакцинированных мышей должен составлять не менее чем 1:1000 | 2,08 x $10^{10}$ частиц/ доза<br>1 : 2200<br>1,61 x $10^{10}$ частиц/доза<br>1 :25 600 |