№ п/п	Показатель	Норма	Результат
8	**Стерильность** *Компонент I* *Компонент II*	Должен быть стерильным Должен быть стерильным	Стерильный Стерильный
9	**Специфическая безопасность** *Компонент II*	Менее 5 репликативно-компетентных аденовирусных частиц / доза	Менее 5 репликативно-компетентных аденовирусных частиц / доза
10	**Общий белок** *Компонент I* *Компонент II*	Не более 10 мкг/доза Не более 10 мкг/доза	7,6 мкг/доза 4,2 мкг / доза
11	**Бактериальные эндотоксины** *Компонент I* *Компонент II*	Не более 100 ЕЭ/доза Не более 100 ЕЭ/доза	Менее 50 ЕЭ/доза Менее 100 ЕЭ/доза
12	**Специфическая активность** *Компонент I* *Компонент II*	Препарат должен содержать (2,0±1,5) x 10^{10} рекомбинантных аденовирусных частиц 26 серотипа, содержащих ген белка S вируса SARS-CoV-2, в дозе (0,5 мл) Средний титр специфических антител к гликопротеину S вируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови вакцинированных мышей должен составлять не менее чем 1:250 Препарат должен содержать (2,0±1,5) x 10^{10} рекомбинантных аденовирусных частиц 26 серотипа, содержащих ген белка S вируса SARS-CoV-2, в дозе (0,5 мл) Средний титр специфических антител к гликопротеину S вируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови вакцинированных мышей должен составлять не менее чем 1:1000	1,44 x 10^{10} частиц/ доза 1 : 1800 1,78 x 10^{10} частиц/доза 1 :22400